

| COMPOSICIÓN: | Cirustetic® Crema Tópica | Cirustetic® Polvo |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Centella asiática | 1 g | 2 g |
| Excipientes, c.s.p. | 100 g | 100 g |

DESCRIPCIÓN:

Cirustetic® contiene centella asiática un cicatrizante y renovador de tejidos, que sirve para proteger, reparar y reafirmar el tejido de la piel, en la curación y alivio de quemaduras, escaldaduras, eccemas, arrugas, estrías, granos, arañazos, heridas, llagas y úlceras.

INDICACIONES:

Cirustetic® está indicado como regenerador tisular y estimulante de la cicatrización en: úlceras de las cuales se haya aclarado su origen, escaras, fístulas, episiotomías, quemaduras, lesiones traumáticas o quirúrgicas, injertos, radioepitelitis, cicatrices retráctiles y como tratamiento profiláctico para las cicatrices queloides, en distintas especialidades médicas. Insuficiencia venosa responsable de las enfermedades varicosas, úlceras varicosas, así como secuelas de flebitis.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:

En general la migración tisular de la centella asiática no es muy elevada, actúa principalmente a nivel local. La penetración percutánea de los principales componentes de la centella asiática, ácido asiático, ácido madecásico y asiaticósido, es importante y rápida (1 - 3 horas). Los ácidos asiático y madecásico se conjugan con ácido glucurónido y sulfato, eliminándose principalmente por bilis y materia fecal. El asiaticósido es hidrolizado por la microflora intestinal.

La centella asiática posee una acción de estimulación sobre la biosíntesis del colágeno de los fibroblastos de las paredes venosas y de la dermis, contribuyendo de esta forma a una mejor troficidad del tejido conjuntivo. Actúa como factor regularizante a nivel del tejido cicatricial; por medio de su acción en los fibroblastos, controla la producción de fibras colágenas, cuando la regeneración celular se encuentra perturbada, deficiente, excesiva o desorganizada.

REACCIONES ADVERSAS:

Posibilidad de reacciones cutáneas de sensibilización (prurito, sensación de quemadura, eczema). Estas reacciones son poco frecuentes y revierten al suspender la administración del medicamento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Las presentaciones tópicas no están indicadas para uso oftálmico. Evitar su utilización en lesiones con tendencia a macerar.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

INTERACCIONES:

No se conocen hasta la fecha.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

No se ha demostrado que la centella asiática atraviese la barrera placentaria y a la fecha, no se ha demostrado su presencia en la leche materna. Sin embargo, su uso durante el embarazo y lactancia queda a juicio del médico.

SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

No existe información sobre el particular.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: tópica.

Limpia la herida antes de la aplicación.

Aplicar cantidad suficiente para cubrir las lesiones 2 o 3 veces al día.

La duración del tratamiento deberá determinarse en función de la respuesta del paciente, respecto a la lesión.

PRESENTACIONES:

Cirustetic® crema tópica 1%: caja conteniendo 1 tubo colapsible con 20 g.

Cirustetic® polvo 2%: caja conteniendo 1 frasco con 5 g.

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Consérvese en un lugar fresco y seco entre 25 – 30 °C.



Fabricante y Titular:
LABORATORIO LAPROFAR, S.R.L.
C/2da. Av. Los Restauradores No.1,
Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.