

Tinizol®-N

Tinidazol 500 mg | Nistatina 25 mg

Óvulos Vaginales



COMPOSICIÓN:

Cada óvulo contiene:

Tinidazol.....	500 mg
Nistatina.....	25 mg
Excipientes, c.s.p.....	1 óvulo

DESCRIPCIÓN:

Tinizol®-N óvulos es la asociación de un tricomonocida (tinidazol), con un antifúngico (nistatina), lográndose con esta asociación, combatir la mayoría de las infecciones vaginales producidas por microorganismos sensibles a esta combinación.

INDICACIONES:

Tinizol®-N óvulos está indicado en infecciones vaginales causadas por trichomonas vaginales y candida albicans y vaginitis mixta.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:

Absorción: tanto el tinidazol como la nistatina en la aplicación tópica vaginal no se absorben y ejercen su acción en el lugar de la aplicación.

Excreción: al no ser absorbidos localmente, no hay excreción.

El tinidazol altera el ADN de las bacterias y protozoos impidiendo una correcta replicación. La nistatina actúa sobre la pared del hongo a nivel de los ergosteroles, aumentando la permeabilidad de la membrana, razón por lo que esta célula eclosiona y no se reproduce.

REACCIONES ADVERSAS:

En raras ocasiones se han presentado dolores abdominales, náuseas, exantemas y sabor metálico en la boca.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Evitar ingerir bebidas alcohólicas o medicamentos que lo contengan, ya que pueden provocar calor, enrojecimiento, vómitos, taquicardia.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes hipersensibles a los principios activos, o con trastornos neurológicos orgánicos, o con discrasia sanguínea. Embarazo y lactancia.

INTERACCIONES:

El tinidazol puede interferir en el metabolismo de la warfarina y puede producir aumento del tiempo de sangría (tiempo de protrombina) aumentando el riesgo de sangrado.

El fenobarbital, la fenitoína y la rifampicina disminuyen la vida media plasmática del tinidazol.

La tetraciclina puede inhibir los efectos de los nitroimidazoles en general.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

Embarazo: a pesar de que no se han reportado efectos teratogénicos en la experimentación con animales, no se recomienda el uso de tinidazol en el embarazo.

Lactancia: no se recomienda su uso.

SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

En estos casos se han reportado síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal alto y/o cefalea y se recomienda consultar al médico o acudir al centro de atención médica más cercano. En caso de sobredosis el tratamiento es sintomático.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: intravaginal.

Introducir en la vagina, lo más profundo posible, 1 óvulo 2 veces al día, durante 7 o 14 días, o según criterio médico.

Recomendación: para lograr resultados más eficaces, se recomienda la terapia combinada: oral-intravaginal. Por tanto, al inicio del tratamiento administrar oralmente 2 g de tinidazol tabletas, en dosis única y administrar esta misma dosis a su pareja.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 2 tiras con 4 óvulos vaginales.

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Consérvese en un lugar fresco y seco entre 25 - 30°C.



Fabricante y Titular:
LABORATORIO LAPROFAR, S.R.L.
C/2da. Av. Los Restauradores No.1,
Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.