

CiruStetic® - NH

Centella Asiática, Neomicina, Sulfato Hidrocortisona

Crema Dérmica



COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contienen:

Centella asiática.....2.00 g

Neomicina sulfato.....0.60 g

Hidrocortisona.....1.00 g

Excipientes, c.s.p.....100 g

DESCRIPCIÓN:

Cirustetic®-NH es la combinación de centella asiática un cicatrizante y renovador de tejidos, que sirve para proteger, reparar y reafirmar el tejido de la piel, en la curación y alivio de quemaduras, escaldaduras, eccemas, arrugas, estrías, granos, arañazos, heridas, llagas y úlceras. Neomicina sulfato un antibiótico, se usa para prevenir o tratar las infecciones de la piel provocadas por bacterias. Hidrocortisona un corticosteroides utilizado para tratar el enrojecimiento, la hinchazón, la picazón y las molestias de diferentes afecciones de la piel.

INDICACIONES:

Cirustetic®-NH está indicada para el tratamiento de la dermatitis infecciosa, heridas, quemaduras sobreinfectadas con reacción inflamatoria. También en fisura anal.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:

Centella asiática

En general la migración tisular de la centella asiática no es muy elevada, actúa principalmente a nivel local. La penetración percutánea de los principales componentes de la centella asiática, ácido asiático, ácido madecásico y asiaticósido, es importante y rápida (1-3 horas). Los ácidos asiáticos y madecásico se conjugan con ácido glucurónico y sulfato, eliminándose principalmente por bilis y materia fecal. El asiaticósido es hidrolizado por la microflora intestinal.

La centella asiática posee una acción de estimulación sobre la biosíntesis del colágeno de los fibroblastos de las paredes venosas y de la dermis, contribuyendo de esta forma a una mejor troficidad del tejido conjuntivo. Actúa como factor regularizante a nivel del tejido cicatricial; por medio de su acción en los fibroblastos, controla la producción de fibras colágenas, cuando la regeneración celular se encuentra perturbada, deficiente, excesiva o desorganizada.

Neomicina sulfato

La neomicina no es absorbida cuando es aplicada en la piel intacta; sin embargo, el medicamento es absorbido fácilmente a través de la piel que presenta capas perdidas de la queratina como en los casos de heridas, quemaduras o úlceras. Debido a que reduce el número superficial de bacterias, siendo un antiinfeccioso tópico útil para prevenir infecciones menores en heridas de la piel. Es rápidamente absorbida y excretada por los riñones en su forma activa, se ha reportado que tiene una vida media de 2 a 3 horas.

La neomicina inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante su unión irreversible a la subunidad ribosómica 30 S de las bacterias susceptibles.

Hidrocortisona

Los glucocorticoides pueden ser absorbidos por la piel; si la administración es crónica o en grandes

áreas puede causar efectos sistémicos. Una vez en el plasma, 90% o más de la molécula se une en forma reversible a proteínas. El 70% se metaboliza en el hígado. La mayor parte se excreta por la orina. El mecanismo de acción antiinflamatoria de los corticosteroides tópicos no es muy claro. Han sido utilizados varios métodos de laboratorio, incluyendo ensayos con vasoconstrictores, para comparar y predecir las potencias y/o la eficacia clínica de los distintos corticosteroides tópicos. Existen evidencias que sugieren que hay una correlación entre la potencia vasoconstrictora y la eficacia terapéutica en el paciente.

REACCIONES ADVERSAS:

Reacciones de hipersensibilidad tales como prurito, sensación de quemadura y erupciones eccemati-formes en la piel. Estos efectos se presentan cuando se usa este medicamento sobre áreas extensas sobre la piel, y por uso prolongado. Lesiones de eccema pueden diseminarse a distancia de zonas. Por la neomicina la alergia puede ser cruzada con otros antibióticos de la familia de los aminoglucósidos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No utilizar en grandes superficies, bajo oclusión o en capas espesas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

INTERACCIONES:

Si usted está utilizando algún otro medicamento tópico que contenga antibióticos como gentamicina, consulte a su médico o farmacéutico antes de aplicar este medicamento.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

Su uso durante el embarazo y lactancia queda a juicio del médico.

SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:

No existe información sobre el particular.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración: tópica.

Limpiar la herida antes de la aplicación.

Aplicar cantidad suficiente para cubrir las lesiones 2 o 3 veces al día.

La duración del tratamiento deberá determinarse en función de la respuesta del paciente, respecto a la lesión.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 1 tubo colapsible con 10 g.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Venta por receta médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco y seco entre 25 – 30 °C.



Fabricante y Titular:
LABORATORIO LAPROFAR, S.R.L.
C/2da. Av. Los Restauradores No.1,
Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.